



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr 403
E-mail fitosj@dadrsj.ro

Telefon/fax: 0260/620063

Buletin de avertizare
Nr 1 din 14.02.2018
(IN ATENTIA POMICULTORILOR)

Tratamentele din perioada repausului vegetativ in plantatiile pomicole au importanta foarte mare in reducerea (combaterea) daunatorilor care ierneaza sub sau pe scoarta pomilor: paduchi testosi, oua de acarieni, afide, cotari si psilide.

Aceste tratamente se vor efectua pana la umflarea mugurilor.

Pentru combaterea daunatorilor amintiti mai sus, se va folosi unul din urmatoarele insecticide:

- Confidor Oil SC 004 - 1,5% sau
- Nuprid Oil 004 CE - 1,5% sau
- Mospilan 20 SG - 0,450 kg/ha + 0,5% TOIL (adjuvant pe baza de ulei vegetal) sau
 - Juvinal 10 EC - 0,1% (doar larve hibernante de San - Jose')
 - Ovipron Top - 2500 ml/100 l apa

Pentru distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene (rapan, la mar si par, monilioze la toate speciile pomicole, ciuruirea frunzelor la samburoase, basicarea frunzelor la piersic, patarea rosie a frunzelor la prun etc.) cat si a bacteriozelor este recomandat sa se foloseasca unul din urmatoarele produse:

- Champion 50 WP - 0,2%-0,3% ;
- Funguran OH 50 WP - 0,2% - 0,3% ;
- Cuproxat Flowable - 0,35%;
- Alcupral 50 PU - 0,3%;
- Zeama Bordeleza tip „MIF" - 0,5%.

cu specificarea ca **tratamentul cu produsul cupric sa se faca imediat dupa efectuarea igenei fitosanitare si a taierilor de fructificare, pentru a proteja ranile produse, impotriva infestarii cu boli de scoarta si lemn, in special cu bacteria care produce focul bacterian al rozaceelor.**

MASURI PRELIMINARE DETERMINANTE IN REUSITA TRATAMENTELOR:

- Defrisarea (arderea) vegetatiei ierboase si arbustoide din plantatie.

- Adunarea frunzelor si a fructelor cazute din anul trecut(unde este posibil).
- Efectuarea taielor de formare, corectie, intretinere sau fructificare.
- Alte masuri de igiena fitosanitara (eliminarea drajonilor, a fructelor mumificate din coroana, a cuiburilor de omizi,etc).

Toate resturile vegetale rezultante se aduna si se ard, pe loc, in livada.

- Ramurile atacate (sau suspecte) de focul bacterian se elimina prin taierea lor la 50 cm sub zona uscata, in lemn aparent sanatos (bacteria nu ierneaza in lemnul uscat, ci in zona „verde”, aparent sanatoasa). In acest caz, al pomilor afectati de focul bacterian, uneltele – foarfeci, fierastrau, se vor dezinfecata, in mod obligatoriu, la trecerea de la un pom la altul cu spirt medicinal sau alcool denaturat. Dezinfecția uneltelelor se face si dupa incheierea taielor.

- Ramurile rezultante precum si pomii defrisati datorita atacului de foc bacterian generalizat se aduna si se ard, pe loc, in livada.

- Pomii se vor imbaia cu solutia de stropit, inclusiv tulpina. Vom insista asupra ranilor rezultante in urma taielor.
- Tratamentele se vor efectua in zilele cu temperaturi peste 6°C, pe timp liniștit, fara vant, cand pomii sunt zvintati.

Pentru agentii de daunare avertizati, se vor utiliza doar produse de protectia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesata la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea Fitosanitar – adresa web:<https://aloe.anfdf.ro>, utilizator - quest ; parola – guest.

Cititi si respectati instructiunile si informatiile inscrise pe eticheta produselor de protectia plantelor

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

Alte informatii.

Respectati conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a ppp in exploataatiile agricole, cum sunt prevazute in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a ppp cap. 2 si 3 (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate - in -domeniul-fitosanitar.html>).

Nu se aplica tratamente cu produse de protectia plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii (art. 16 alin. (2) si anexa nr. II din Legea nr. 107/1996 legea apelor si HG nr. 683/2013, sectiunea B)

Clatiti cu apa de trei ori ambalajele in care au fost ppp si le returnati la o unitate de preluare a deseurilor (SCAPA). Folositi aparate de stropit in stare perfecta de functionare, bine reglate si testate periodic (OM 1234/2006 cap. VI pct. 6.7). Dupa fiecare tratament, echipamentele de protectie a muncii si utilajele utilizate se curata. Fermierul trebuie sa aiba conditii de stocare a apelor reziduale (fosa sau recipienti de stocare)

Conform Regulamentului (CE) 1107/2009 art. 67, utilizatorii (fermierii) ppp au obligatia de a tine evidenta ppp utilizate, intr-un registru de evidenta, dupa modelul de mai jos, care va fi numerotat.

Nume fermier/Denumire societate

Domiciliu/sediu

Ferma (nume,adresa)

Evidenta tratamentelor fitosanitare pe culturi

Da E frat Tra	Data efectuarii tratamentului zi, luna, an	Cultura Locul de aplicare (parc e-la) -ha-	Timpul aplicării (la avertizare sau nuanță)	Tratamentul efectuat						Nume persoana care a efectuat tratamentul si semnatura	Data incepere-rii recoltării	Nr. data document consu catre populatie
				Agenția de dauna	Denumire ppp	Dozajomolozagata / folosita	Suprafata	Cantitatea utili-zata				

Acest registru va fi pastrat minim 3 ani. Nerespectarea acestei cerinte este contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000 – 10000 lei (HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerinte sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.

Intocmit –ing. Hosu Aurelia

Sef birou Oficial Fitosanitar Salaj
ing. Traian Groza