



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr 403  
E – mail fitosj@dadrjsj.ro

Telefon/fax:0260/620063

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 5 din 12.04.2018

Condițiile climatice din ultimele zile, au favorizat, apariția și dezvoltarea viespilor cu ferăstrău (*Hoplocampa minuta* și *Hoplocampa flava*), viespea sâmburilor de prun (*Eurythoma schreineri*), insecte defoliatoare, afide și a bolilor de natură micotică și bacteriană: monilioze, (*Monilinia* spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun (*Polystigma rubrum*), bășicarea frunzelor de piersic, (*Taphrina deformans*), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor (*Coryneum b.*, *Xanthomonas* spp.), arsura bacteriană (*Pseudomonas* spp.) care pot cauza pierderi importante la speciile sâmburoase.

Pentru combaterea daunatorilor la **specia prun** recomandam efectuarea a doua tratamente.

Primul tratament chimic va începe la soiurile cu înflorire timpurie, când 15% din flori și – au scuturat petalele și se continuă la soiurile cu înflorire tarzie.

La efectuarea tratamentului recomandam folosirea de insecticide care să protejeze albinele și restul entomofaunei utile: FASTAC 10 EC – 0,02% sau KARATE ZEON – 0,015%.

Având în vedere faptul că până la completă maturare larva viespilor cu ferăstrău migrează în două – trei fructe, precum și pericolul pe care – l prezintă un alt daunator al prunului - **viespea sâmburilor** este indicat să se revină cu un al 2-lea tratament la 6-8 zile de la primul tratament folosind CALYPSO 480 SC – 0,02%.

Pentru prevenirea și combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană (monilioze, ciuruii, arsura bacteriană comună) recomandam ca în soluția de stropit să se adauge una din combinațiile de fungicide:

1. SIGNUM - 0,05% + DITHANE M 45 - 0,2%;
2. TOPSIN M 70 – 0,07% + DITHANE M 45 - 0,2% ;
3. FOLICUR SOLO 250 EW - 0,075 – 0,1% sau ORIUS 25 EW – 0,075 – 0,1% + CAPTAN 50 WP – 0,25% sau MERPAN 50 WP – 0,25% ;
4. CHORUS 75 WG - 0,02 + CAPTAN 50 WP – 0,25%.

Dacă în această perioadă intervin ploi sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.

La speciile de **cireș și vișin**, se vor aplica două tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor de natură micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.

Primul tratament se efectuează când 15% din flori și – au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse:

1. SIGNUM - 0,05% + CALYPSO 480 SC - 0,02%;
2. CHORUS 75 WG - 0,02 + KARATE ZEON - 0,015%;
4. TOPSIN 70 WDG 0,07% + FASTER 10 CE – 0,025% ;
5. SWITCH 62,5 WG - 1,0 kg/ha + DECIS MEGA 50 EW - 0,015%;
6. TOPAS 100 EC - 0,05% + FASTAC 10 EC - 0,02% ;

La speciile de **piersic și cais** se vor aplica două tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor de natura micotica și bacteriana, afide, insecte defoliatoare.

Primul tratament se efectuează când 15% din flori și – au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse:

1. SCORE 250 EC 0,02% + CALYPSO 480 SC - 0,02%;
2. SYLLIT 400 SC - 0,2% + DITHANE M 45 - 0,2% + FASTAC 10 EC - 0,02% ;
3. TOPSIN 70 WDG - 0,07% + KARATE ZEON 0,015% ;
4. BRAVO 500SC – 0,15% + FASTER 10 CE – 0,025% .

Dacă în această perioadă intervin ploii sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.

Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecția plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:<https://aloe.anfd.ro>, utilizator - quest ; parola – guest.

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecția plantelor

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala și 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Alte informații.

Respectați condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatarea agricolă, cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp cap. 2 și 3 (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>).

Nu se aplică tratamente cu produse de protecția plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (art. 16 alin. (2) și anexa nr. II din Legea nr. 107/1996 legea apelor și HG nr. 683/2013, secțiunea B)

Clătiți cu apă de trei ori ambalajele în care au fost ppp și le returnați la o unitate de preluare a deșeurilor ( SCAPA). Folosiți aparate de stropit în stare perfectă de funcționare, bine reglate și testate periodic ( OM 1234/2006 cap. VI pct. 6.7 ). După fiecare tratament, echipamentele de protecție a muncii și utilajele utilizate se curată. Fermierul trebuie să aibă condiții de stocare a apelor reziduale ( fosa sau recipienti de stocare )

Conform Regulamentului ( CE ) 1107/2009 art. 67, utilizatorii ( fermierii ) ppp au obligația de a ține evidența ppp utilizate, într-un registru de evidență, după modelul de mai jos, care va fi numerotat.

Nume fermier/Denumire societate

Domiciliu/sediu

Ferma (nume,adresă)

Evidența tratamentelor fitosanitare pe culturi

Data	Data efectuării tratamentului zi, luna, an	Cultura Locul de aplicare (parcela)-ha-	Timpul aplicării (la avertizare sau nu)	Tratamentul efectuat					Nume persoana care a efectuat tratamentul și semnatura	Data începerii recoltării	Nr. data document consur către populație
				Agent de daunare	Denumire ppp	Doza omologată / folosită	Supra-fata	Cantitatea utilizată			

Acest registru va fi pastrat minim 3 ani. Nerespectarea acestei cerinte este contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 8000 – 10000 lei ( HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 ( i )

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, toate aceste cerințe sunt cuprinse în SMR 10 și sunt obligatorii de respectat de către toți fermierii care beneficiază de subvenție APIA pe suprafață.

Intocmit –ing. Hosu Aurelia

Sef birou  
ing. Traian Groza