



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr 403

Telefon/fax:0260/620063

E – mail fitosj@dadrsl.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 5 din 08.04.2019

Condițiile climatice din ultimele zile, au favorizat, apariția și dezvoltarea viespilor cu ferăstrău (*Hoplocampa minuta* și *Hoplocampa flava*), viespea sămburilor de prun (*Eurythoma schreineri*), insecte defoliatoare, afide și a bolilor de natura micotică și bacteriană: monilioze, (*Monilinia* spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun (*Polystigma rubrum*), bășicarea frunzelor de piersic, (*Taphrina deformans*), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor (*Coryneum* b., *Xanthomonas* spp.), arsura bacteriană (*Pseudomonas* spp.) care pot cauza pierderi importante la speciile sămburoase.

Pentru combaterea daunătorilor la **specia prun** recomandam efectuarea a doua tratamente.

Primul tratament chimic va începe la soiurile cu înflorire timpurie, când 15% din flori și – au scuturat petalele și se continuă la soiurile cu înflorire târzie.

La efectuarea tratamentului recomandam folosirea de insecticide care să protejeze albinele și restul entomofaunei utile: FASTAC 10 EC – 0,02% sau KARATE ZEON – 0,015%.

Având în vedere faptul că până la completa maturare larva viespilor cu ferăstrău migrează în două – trei fructe, precum și pericolul pe care – îl prezintă un alt daunător al prunului - **viespea sămburilor** este indicat să se revină cu un al 2-lea tratament la 6-8 zile de la primul tratament folosind CALYPSO 480 SC – 0,02%.

Pentru prevenirea și combaterea bolilor de natura micotică și bacteriană (monilioze, ciurui, arsura bacteriană comună) recomandam ca în soluția de stropit să se adauge una din combinațiile de fungicide:

1. SIGNUM - 0,05% + DITHANE M 45 - 0,2%;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + DITHANE M 45 - 0,2% ;
3. FOLICUR SOLO 250 EW - 0,075 – 0,1% sau ORIUS 25 EW – 0,075 – 0,1% (0,75 – 1,0 l/ha) + CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau MERPAN 80 WDG – 0,15% ;
4. CHORUS 75 WG – 0,02% + CAPTAN 80 WDG – 0,15%.

Dacă în această perioadă intervin ploii sau temperaturi scăzute, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile nefavorabile.

La speciile de **cireș și vișin**, se vor aplica două tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor de natura micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.

Primul tratament se efectuează când 15% din flori și – au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse:

1. SIGNUM - 0,05% + CALYPSO 480 SC - 0,02%;
2. CHORUS 75 WG – 0,02% + KARATE ZEON - 0,015%;
4. TOPSIN 70 WDG - 0,07% + FASTER 10 CE – 0,025% ;
5. SWITCH 62,5 WG - 1,0 kg/ha + KARATE ZEON - 0,015%;
6. TELDOR 500 SC - 0,08% + FASTAC 10 EC - 0,02% ;

La speciile de **piersic și cais** se vor aplica două tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor de natura micotică și bacteriană, afide, insecte defoliatoare.

Primul tratament se efectuează când 15% din flori și – au scuturat petalele, iar tratamentul 2 se va repeta la 8-10 zile, utilizând una din combinațiile de produse:

Fermierul numeroteaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Nerespectarea acestei cerinte este contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000 – 10000 lei, conform HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerinte sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.

Intocmit –ing. Hosu Aurelia

Coordonator Oficiul Fitosanitar Salaj
Stana Marius