



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr 403
Telefon/fax:0260/620063

E – mail ofsalaj@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 22 din 11.07.2019

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorilor, care pot cauza pierderi importante la **culturile crucifere** (varza de vara, varza de toamna, conopida, gulii). Pentru combatere, pe parcelele unde se semnalează prezenta Musculitei albe a verzei (*Aleyrodes brassicae*), Musca verzei (*Chortophila brassicae*), Puricelui verzei (*Phyllotreta atra*), Buha verzei (*Mamestra brassicae*), Paduchelui cenușiu (*Brevicoryne brassicae*), Plosnita roșie a verzei (*Eurydema ornata*), Fluturului alb al verzei (*Pieris brassicae*), se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din următoarele insecticide :

1. MOVENTO 100 SC – 0,750 l/ha ;
2. CORAGEN – 125 ml/ha ;
3. MOSPILAN 20 SG (Krima 20 SC – a doua denumire comercială) – 0,025% (0,150 kg/ha p.c.);
4. KARATE ZEON – 0,015% (0,09 l/ha) ;
5. LASER 240 SC – 0,03% ;
6. FASTER 10 CE – 0,03%.

Perioada optimă de tratament este la 2-3 zile după eclozarea primelor larve ale fluturului alb și de buha, PED (Pragul economic de daunare) fiind de 2 larve/planta la Buha și Fluturului alb, 5 -10 afide / planta în cazul paduchilor cenușii, sub 10 plosnite/m² în cazul Plosnitei roșii. Pe parcelele unde sunt prezente plosnitele, coloniile de paduchi cenușii, musculitele, se intervine imediat. Tratamentul se repetă la un interval de 8-10 zile, folosind un produs cu o altă substanță activă.

Pentru prevenirea atacului de boli, respectiv patarea albă, alternarioza, mana, fainarea, putregaiul, albumeala, recomandăm ca în soluția de stropit să se adauge unul din fungicide :

1. ORTIVA TOP – 1,0 l/ha ;
2. AMISTAR – 0,75 – 1 l/ha ;
3. LUNA EXPERIENCE – 0,9 l/ha + DITHANE M - 45 – 0,2%.

Pentru o mai bună aderență a insecticidului pe planta, se recomandă adăugarea în soluția de stropit ca adziv aracetul – 0,2%.

Tratamentul se va repeta la interval de 7 – 10 zile în funcție de remanenta produsului folosit și de condițiile climatice.

Pentru combaterea melcilor prezenți în această perioadă în culturi recomandăm să se aplice, prin împrăștiere la suprafața solului, pe randul de plante, fără să se încorporeze Agrosan B – 15 kg/ha;

Atenție! Granulele nu trebuie să ajungă între frunzele capatanilor sau inflorescenței în formare.

Fermierul numeroteaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Nerespectarea acestei cerinte este contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000 – 10000 lei, conform HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerinte sunt cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.

Intocmit – Hosu Aurelia

Coordonator Oficiul Fitosanitar Salaj

Stana Marius